

COMPLEJOS NUTRICIONALES

CALBOSET

Fertilizante foliar – Complejo Ca-B

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

CALCIO BORO

CALBOSET combina calcio (CaO 11 %) y boro (B 2 %) con 2 % de algas marinas, para uso en pre-floración, floración y cuajado. Contiene el doble de boro que CALBOZINC, por lo que resulta especialmente útil en cultivos de alta demanda de este elemento, como espárrago, remolacha y brásicas. Ayuda a fortalecer los tejidos y a prolongar la vida útil de flores y frutos.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Calcio (CaO)	11.0 %
Boro (B)	2.0 %
Algas Marinas	2.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

El calcio se incorpora a las paredes y membranas celulares y les da firmeza, mientras que el boro facilita el transporte de azúcares hacia las flores y la germinación del polen, lo que se traduce en un mejor cuajado.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Marrón oscuro
pH (sol. 1 %)	4.5 – 5.5
Densidad (20 °C)	1.25 – 1.35 g/mL
Solubilidad	100 % en agua

BENEFICIOS

- Doble contenido de boro respecto a CALBOZINC
- Mejora la polinización y el cuajado
- Refuerza la pared celular desde el inicio del fruto
- Retrasa el envejecimiento prematuro de flores y frutos
- Indicado para espárrago, remolacha y brásicas

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL 1.5–2.5 L/200 L

FRECUENCIA Pre-floración, floración y cuajado

- Pre-floración
- Floración (cada 10 días en espárrago)
- Cuajado

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Espárrago (alta exigencia en B)	1.5–2.5	8–12	Pre-floración y floración; cada 10 días
Hortalizas (tomate, pimiento, ají)	1.5–2.5	8–12	Pre-floración y cuajado
Frutales (palto, cítricos, vid)	1.5–2.5	8–12	Pre-floración, floración y cuajado

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas, salvo los de pH muy alcalino. No mezclar con fosfatos ni sulfatos. Hacer siempre una prueba de compatibilidad previa.

PRECAUCIONES

La dosis máxima de 2.5 L/200 L aporta 250 ppm de boro, límite para cultivos tolerantes. En cítricos, kiwi y aguacate reducir a 1.5 L/200 L, y en cultivos sensibles al boro no superar 2 aplicaciones por etapa fenológica; el exceso puede causar quemaduras foliares. Aplicar en las horas frescas del día.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 L

5 L

20 L

200 L

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.