

COMPLEJOS NUTRICIONALES

MULTITRACE

Fertilizante foliar – Complejo de microelementos
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
MICROELEMENTOS

MULTITRACE es un complejo foliar que aporta magnesio, azufre, zinc, hierro, manganeso, cobre y molibdeno junto con 5 % de aminoácidos. Su composición responde a las carencias de micronutrientes más habituales en los suelos agrícolas del Perú. Permite corregir deficiencias múltiples con un solo producto, en lugar de varios correctores individuales.


COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Magnesio (MgO)	6.00 %
Azufre (S)	3.00 %
Zinc (Zn)	1.00 %
Hierro (Fe)	1.00 %
Manganeso (Mn)	1.00 %
Cobre (Cu)	0.10 %
Molibdeno (Mo)	0.05 %
Aminoácidos	5.00 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

Los aminoácidos actúan como vehículo de los microelementos, facilitando su paso a través de la cutícula y una absorción equilibrada, sin que unos nutrientes compitan con otros.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Verde petróleo
pH (sol. 1 %)	3.5 – 4.5
Densidad (20 °C)	1.20 – 1.30 g/mL
Solubilidad	100 % en agua

BENEFICIOS

- Siete nutrientes en una sola aplicación
- Sustituye de 4 a 6 correctores individuales
- Absorción uniforme gracias a los aminoácidos
- Uso preventivo o curativo según el estado del cultivo
- Menor costo y tiempo de aplicación por hectárea

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL	0.5–1.0 L/200 L
FRECUENCIA	Preventivo mensual; curativo cada 14 días

- Post-emergencia o post-trasplante
- Desarrollo vegetativo
- Ante síntomas de deficiencia (cada 14 días)

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas (deficiencias múltiples)	0.5–1.0	3–5	Preventivo mensual; curativo cada 14 días
Frutales (mantenimiento)	0.5–1.0	3–5	Preventivo mensual; ante síntomas cada 14 días
Papa y maíz	0.5–1.0	3–5	Post-emergencia y durante desarrollo vegetativo

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas, salvo los de pH muy alcalino. Hacer siempre una prueba de compatibilidad previa.

PRECAUCIONES

No superar 1.0 L/200 L: por su contenido de cobre (0.10 %), dosis mayores pueden causar fitotoxicidad. En cultivos muy sensibles al cobre, como vid y lechuga, usar correctores específicos (FERROVERDE o ZINCPRO). Aplicar en las horas frescas del día.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 L	5 L	20 L	200 L
-----	-----	------	-------

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.