

FERTILIZANTES ESPECIALIZADOS

REBROTEK

Fertilizante foliar – Forrajero

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

FORRAJERO

REBROTEK es un fertilizante foliar para pastos y forrajes con nitrógeno (20 %), fósforo (10 % P_2O_5) y potasio (5 % K_2O), reforzado con giberelina (GA_3), auxina (ANA) y extracto de algas marinas. Acelera el rebrote después del corte o del pastoreo para lograr más materia seca por hectárea.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	20.0 %
Fósforo (P_2O_5)	10.0 %
Potasio (K_2O)	5.0 %
Giberelina (GA_3)	250 ppm
Auxinas (ANA)	250 ppm
Algas Marinas	3.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

El nitrógeno impulsa la síntesis de clorofila y proteínas foliares, mientras que la GA_3 y el ANA (250 ppm cada una) activan las yemas basales y la elongación celular del meristemo de rebrote. El potasio ayuda a mantener la turgencia en épocas de calor.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Marrón oscuro
pH (sol. 1 %)	4.0 – 5.0
Densidad (20 °C)	1.22 – 1.28 g/mL
Solubilidad	100 % en agua

BENEFICIOS

- Rebrote rápido y vigoroso tras el corte o el pastoreo
- Mayor producción de materia seca por hectárea
- Fitohormonas y algas que activan las yemas basales
- Potasio para mantener la turgencia con altas temperaturas

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL	2.0–3.0 L/200 L
FRECUENCIA	Inmediatamente post-corte; cada 15 días

- Inmediatamente después del corte
- Cada 15 días en rye grass y festuca
- Alfalfa: después de cada corte, cada 21 días
- Brachiaria y kikuyo: después del corte o del pastoreo

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Rye grass y festuca (corte)	2.0–3.0	20–30	Inmediatamente post-corte; cada 15 días
Alfalfa (post-corte)	2.0–3.0	20–30	Inmediatamente post-corte; cada 21 días
Brachiaria y pasto kikuyo	2.0–3.0	20–30	Post-corte o pastoreo

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de fondo en pasturas, excepto con productos de pH muy alcalino. Realizar siempre una prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES

Formulado para pastos y forrajes; no usar en otros cultivos. No superar 3 L/200 L. Aplicar en horas frescas, inmediatamente después del corte, para aprovechar la actividad de las yemas basales.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

- 1 L
- 5 L
- 20 L
- 200 L

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.