

NPK COMPLETOS

SUPERFOL 1-25-35

Fertilizante foliar – NPK alto potasio

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

NPK 1-25-35

SUPERFOL 1-25-35 es la fórmula de la línea SUPERFOL con mayor contenido de potasio (K_2O 35 %), acompañado de P_2O_5 25 %, N 1 % y 2 % de algas marinas. Se emplea en el llenado, engrose y maduración de frutos, tubérculos y bulbos para mejorar azúcares, color y calibre.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	1.0 %
Fósforo (P_2O_5)	25.0 %
Potasio (K_2O)	35.0 %
Algas Marinas	2.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

El potasio activa las enzimas que movilizan los azúcares desde las hojas hacia el fruto, mientras que el fósforo suministra la energía necesaria para ese transporte por el floema. Su nitrógeno mínimo evita reactivar el crecimiento vegetativo durante la maduración.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Marrón oscuro
pH (sol. 1 %)	8.5 – 9.5
Densidad (20 °C)	1.45 – 1.50 g/mL
Solubilidad	100 % en agua

BENEFICIOS

- Máxima concentración de potasio de la línea SUPERFOL
- Incrementa los sólidos solubles (°Brix) y mejora el color del fruto
- Favorece el llenado y el calibre de frutos, tubérculos y bulbos
- No estimula brotaciones durante la maduración
- Adecuado para programas de exportación (GlobalGAP, BRC)

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL	1.0–2.0 L/200 L
FRECUENCIA	Semanal, desde el llenado hasta la maduración

- Inicio de llenado o engrose de fruto
- Viraje de color
- Maduración hasta precosecha

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa (viraje de color)	1.0–2.0	10–20	Semanal desde llenado a cosecha
Arándano y fresa (maduración)	1.0–2.0	10–15	Inicio de maduración; semanal
Palto y cítricos (calibre)	1.0–2.0	10–20	Engrose a maduración; semanal

COMPATIBILIDAD

Producto de reacción alcalina: ajustar siempre el caldo a pH 5.5–6.5 antes de mezclar. No combinar con productos de marcada reacción ácida ni con fuentes adicionales de fosfato. Hacer siempre una prueba de compatibilidad previa.

PRECAUCIONES

Dosis máxima de 2 L/200 L (0.35 % de K₂O en el caldo); en clima caluroso reducir a 1.5 L/200 L. Las aplicaciones frecuentes pueden inducir deficiencia de magnesio: complementar con ENZIMAG cada 3 semanas. No aplicar en plena floración; preferir las horas frescas del día.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 L
5 L
20 L
200 L

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.