

NPK COMPLETOS

SUPERFOL 20-20-20

Fertilizante foliar – NPK completo

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

NPK 20-20-20

SUPERFOL 20-20-20 es un fertilizante foliar NPK de proporción equilibrada (20 % de N, P₂O₅ y K₂O), enriquecido con aminoácidos y algas marinas. Es la opción más versátil de la línea para una nutrición de mantenimiento a lo largo de todo el ciclo, cuando no hay una deficiencia puntual que corregir. Se integra con facilidad en los programas fitosanitarios.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	20.0 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	20.0 %
Potasio (K ₂ O)	20.0 %
Aminoácidos	2.0 %
Algas Marinas	2.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

Aporta los tres macronutrientes principales en igual proporción para sostener el crecimiento, la floración y la producción. Los aminoácidos y las algas facilitan su ingreso por la cutícula.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Suspensión concentrada
Color	Marrón
pH (sol. 1 %)	4.0 – 5.0
Densidad (20 °C)	1.40 – 1.50 g/mL
Solubilidad	Dispersable en agua

BENEFICIOS

- Nutrición equilibrada para cualquier etapa del cultivo
- Aminoácidos que mejoran la absorción foliar
- Se mezcla con fungicidas e insecticidas de amplio espectro
- Menos pasadas de aplicación y menor costo por hectárea
- Fórmula de mantenimiento de uso general

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL 1.5–2.5 L/200 L

FRECUENCIA Cada 10–14 días (versátil, todo el ciclo)

- Desarrollo vegetativo
- Floración y cuajado
- Post-emergencia a precosecha en papa y tubérculos
- Mantenimiento cada 10–14 días

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas (todo el ciclo)	1.5–2.5	15–25	Cada 10–14 días durante todo el ciclo
Frutales (vegetación y producción)	1.5–2.5	15–20	Vegetación, floración y cuajado
Papa y tubérculos	1.5–2.5	15–25	Post-emergencia a pre-cosecha; cada 12 días

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de agroquímicos, incluidos fungicidas e insecticidas de amplio espectro, salvo productos de pH superior a 9. Realizar siempre una prueba de compatibilidad previa.

PRECAUCIONES

No superar 3 L/200 L, ya que puede elevar en exceso la CE del caldo. En fertirriego, controlar la CE de la solución para evitar acumulación de sales. Aplicar en horas frescas.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 L

5 L

20 L

200 L

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.