

NPK COMPLETOS

SUPERFOL 32-10-10

Fertilizante foliar – NPK completo

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

NPK 32-10-10

SUPERFOL 32-10-10 es la fórmula de mayor contenido de nitrógeno de la línea SUPERFOL (32 % N), complementada con fósforo, potasio y algas marinas. Está pensada para cultivos que requieren un crecimiento foliar rápido: hortalizas de hoja, cereales en macollaje, forrajes tras el corte y frutales en brotación intensa.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	32.0 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	10.0 %
Potasio (K ₂ O)	10.0 %
Algas Marinas	2.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

El alto aporte de nitrógeno por vía foliar acelera la síntesis de proteínas y la formación de nuevas hojas y brotes. Su pH ácido mantiene el nitrógeno en formas solubles y reduce las pérdidas por volatilización.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Suspensión concentrada
Color	Negro a marrón
pH (sol. 1 %)	3.5 – 4.5
Densidad (20 °C)	1.40 – 1.48 g/mL
Solubilidad	Dispersable en agua

BENEFICIOS

- Máximo aporte de N de la línea SUPERFOL
- Crecimiento vegetativo rápido y vigoroso
- Rebrote acelerado en forrajes tras el corte
- pH ácido que reduce pérdidas de nitrógeno
- Buen complemento de bioestimulantes para el arranque

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL	1.0–1.5 L/200 L
FRECUENCIA	Cada 10 días; evitar floración plena

- Crecimiento vegetativo, cada 10 días
- Macollaje y encañado en maíz y cereales
- Post-corte en forrajes
- Brotación intensa en frutales

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas de hoja (lechuga, espinaca)	1.0–1.5	15–20	Cada 10 días; evitar floración
Maíz y cereales (macollaje)	1.0–1.5	15–20	Macollaje y encañado; cada 10 días
Forrajes (rye grass, alfalfa)	1.0–1.5	15–20	Post-corte para rebrote vigoroso

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de agroquímicos, salvo productos de pH superior a 9. Realizar siempre una prueba de compatibilidad previa.

PRECAUCIONES

No superar 1.5 L/200 L ni 0.75 % de N en el caldo. No aplicar en floración plena (riesgo de caída de flores) ni durante el llenado de frutos, porque el exceso de N favorece el crecimiento vegetativo en perjuicio de la calidad. Aplicar en horas frescas.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 L	5 L	20 L	200 L
-----	-----	------	-------

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.