

NPK COMPLETOS

SUPERFOL 8-32-6

Fertilizante foliar – NPK alto fósforo

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

NPK 8-32-6

SUPERFOL 8-32-6 es una fórmula NPK líquida con predominio de fósforo (N 8 %, P_2O_5 32 %, K_2O 6 %) y 2 % de algas marinas. Está pensada para acompañar el paso del cultivo a la fase reproductiva, favoreciendo la inducción floral, el cuajado y un desarrollo radicular vigoroso. Su bajo aporte de nitrógeno evita estimular brotaciones vegetativas en el momento en que la planta debe florecer.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	8.0 %
Fósforo (P_2O_5)	32.0 %
Potasio (K_2O)	6.0 %
Algas Marinas	2.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

El fósforo absorbido por la hoja participa en la síntesis de energía (ATP) y de ácidos nucleicos que la planta necesita para diferenciar flores y formar polen y óvulos. Las algas marinas complementan la nutrición y ayudan a sostener la actividad fisiológica durante la floración.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Marrón
pH (sol. 1 %)	4.0 – 5.0
Densidad (20 °C)	1.35 – 1.45 g/mL
Solubilidad	100 % en agua

BENEFICIOS

- Relación P:N de 4:1, orientada a la etapa reproductiva
- Favorece la inducción floral y un cuajado más uniforme
- Estimula el crecimiento de raíces
- No impulsa crecimiento vegetativo durante la floración
- Contribuye a cosechas homogéneas, clave en cultivos de exportación

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL 1.0–2.0 L/200 L

FRECUENCIA Pre-floración y floración; 2–3 aplicaciones

- Pre-floración
- Inicio de floración
- Floración (cada 10 días en hortalizas)

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Frutales (palto, cítricos, mango)	1.0–2.0	10–15	Pre-floración y floración; 2–3 aplic.
Uva de mesa	1.0–2.0	10–15	Pre-floración; 2–3 aplicaciones
Tomate y pimiento (inducción floral)	1.0–2.0	10–15	Pre-floración; cada 10 días

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de agroquímicos de reacción ácida. No mezclar con productos cálcicos en el mismo caldo. Verificar el pH del caldo y hacer siempre una prueba de compatibilidad previa.

PRECAUCIONES

No fitotóxico a la dosis recomendada; no superar 2 L/200 L (0.32 % de P_2O_5 en el caldo). En suelos alcalinos el exceso de fósforo puede inducir deficiencia de zinc: complementar con ZINCPRO si aparecen síntomas. No aplicar con temperaturas superiores a 35 °C; preferir las horas frescas del día.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 L

5 L

20 L

200 L

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.